

Traitement de la Mortellaro (DD)



Congrain (travail)

L'évaluation et le traitement des onglons doit se faire dans un congrain. C'est la seule manière de pouvoir contrôler correctement la région du talon à la recherche de lésions de Mortellaro (DD).



Laver les onglons

La plupart des pieds de vache sont très souillés, ce qui empêche une identification précise et correcte des lésions de Mortellaro (DD). De plus, les pansements ne doivent être posés que sur des onglons propres. C'est pourquoi il est important de laver soigneusement les onglons/le talon à l'eau courante. Nous déconseillons d'utiliser un seau et une brosse, car les bactéries peuvent être transmises d'une vache à l'autre par l'eau souillée et les crins de la brosse.



Sécher

Après le nettoyage, il est important de sécher la région du talon et l'espace interdigité. Suite au risque de transmission de bactéries, il est conseillé d'utiliser du matériel à usage unique tels des serviettes en papier.



Préparation du matériel

Une bonne préparation du matériel et des produits nécessaires facilite le travail. De plus, cela permet de diminuer le temps que la vache passera dans le congrain.



- Gants: à changer entre chaque animal
- Rénette: à désinfecter après chaque animal
- Papier à usage unique: pour sécher
- Compresse/papier ménager: pour le prélèvement de la graisse à traire/Pâte Novaderma®
- Graisse à traire: protège la peau saine
- Pâte Novaderma®: pour le traitement de lésions de Mortellaro (DD)
- Ouate: pour le rembourrage du pansement
- Bande élastique: fixation de la ouate
- Bande Tesa: fixation du pansement



Graisse à traire

La concentration à laquelle la pâte Novaderma® est utilisée a un effet nocif sur la peau saine. C'est pourquoi il est important de protéger la peau saine alentour. Nous conseillons de protéger cette région avec de la graisse à traire.



Pâte Novaderma®

La pâte Novaderma® peut alors être appliquée sur la lésion de Mortellaro (DD). Il est important d'utiliser des gants pour prélever la pâte et de la prélever proprement. Utilisez pour cela une compresse, du papier ménage ou le matériel utilisé pour le pansement.



Ouate pour le rembourrage

La pose d'un pansement léger avec de la ouate permet de maintenir la pâte à l'endroit souhaité. Le rembourrage avec la ouate empêche aussi que le pansement ne soit trop serré et trop compressif. Un pansement autour de la région du talon remplit ces deux fonctions. Les onglons et les surfaces de la sole en contact avec le sol doivent être laissés libres. Sinon le pansement sera rapidement usé et deviendra humide et souillé.



Bande élastique

Une bande élastique autocollante se prête bien pour terminer le pansement. Il est également important de veiller à ce que les surfaces de la sole en contact avec le sol restent libres. Au cas où la bande élastique est posée directement sur la peau sans rembourrage de ouate, il est important de ne pas serrer trop fort afin de ne pas limiter l'irrigation sanguine du pied.



Pansement

A la fin, le pansement peut être renforcé avec de la bande Tesa®. Il est également important de ne pas serrer trop fort lors de cette étape, pour ne pas limiter l'irrigation sanguine du pied.

Le pansement doit rester en place 7 jours. Après 7 jours, la vache sera prise au congrain afin de retirer le pansement et de réévaluer la lésion de Mortellaro. La couche de peau morte au niveau de la lésion de Mortellaro est enlevée.

Un nouveau pansement avec de la pâte Novaderma® doit être posé si la lésion n'est pas complètement guérie (peau saine).



Enfiler la chaussette

Après avoir enfilé la chaussette, celle-ci peut être rabattue vers le bas pour pouvoir appliquer la graisse à traire autour de la lésion et la pâte Novaderma® sur la lésion.

Il est conseillé d'enfiler d'abord la chaussette et d'appliquer ensuite la graisse à traire et la pâte Novaderma®, car cela évite que les pommades ne soient trop fortement étalées.



Graisse à traire

La concentration à laquelle la pâte Novaderma® est utilisée a un effet nocif sur la peau saine. C'est pourquoi il est important de protéger la peau saine alentour. Nous conseillons de protéger cette région avec de la graisse à traire.



Pâte Novaderma®

La pâte Novaderma® peut alors être appliquée sur la lésion de Mortellaro (DD). Il est important d'utiliser des gants pour prélever la pâte et de la prélever proprement. Pour cela il est possible d'utiliser une compresse ou du papier ménage.



Relever la chaussette et evt. fixer à l'aide de bande Tesa®

La chaussette doit être tirée aussi haut que possible afin de laisser libres les surfaces de la sole en contact avec le sol. La bande Tesa® permet de renforcer la chaussette, afin qu'elle tienne bien en place et plus longtemps. La bande Tesa® ne doit pas être serrée trop fortement, afin de ne pas limiter l'irrigation sanguine du pied.

La chaussette doit rester en place 7 jours. Après 7 jours, la vache sera prise au congrain afin de retirer la chaussette et de réévaluer la lésion de Mortellaro. La couche de peau morte au niveau de la lésion de Mortellaro est enlevée.

Un nouveau pansement avec de la pâte Novaderma® doit être posé si la lésion n'est pas complètement guérie (peau saine).

Veillez à toujours porter des gants lors du traitement de lésions de Mortellaro et changez-les entre chaque animal. Ces chaussettes Mortellaro sont des chaussettes à usage unique. Elles doivent être jetées après un traitement unique, afin d'obtenir une guérison optimale. **Surveiller chaque jour les vaches avec pansement/chaussette: si la boiterie empire, contrôler de suite le pansement/la chaussette!**