

# Auswertungen der Umfrage zu fieberhaftem Durchfall bei Milchkühen


**10.08.2026**

Rindergesundheitsdienst Schweiz


# Allgemeines

- Insgesamt wurden 405 validierte Fragebögen ausgewertet.
- Bei 17 % der Fälle waren auch Kälber und Jungtiere betroffen, in nur einem Fall waren auch Schafe betroffen.
- Durchfall hatten die Tiere zwischen 1 bis 20 Tagen, im Mittel 4.5 Tage (Standardabweichung 2.6)
- Fieber hatten die Tiere zwischen 0.5 bis 7 Tage, im Mittel 2.3 Tage (Standardabweichung 1.1)
- Da die Auswertungen der Fragen in Bezug auf die Fütterung keine Auffälligkeiten ergeben haben, werden sie in den folgenden Unterlagen nicht dargestellt.


# Höhenlage der Betriebe




# Anzahl Kühe im Bestand




# Durchschnittliche Herdenleistung




# Haltungsform



# Weidehaltung




# Auftreten der ersten Symptome







# Welche Symptome standen im Vordergrund?




## Anteil betroffener Kühe im Betrieb




# Wie wurde behandelt?




## War die Behandlung wirksam bzw. haben sich die Kühe erholt?




## Sind die Tiere wieder auf ihre ursprüngliche Milchleistung gekommen?




## Wurde Labordiagnostik durchgeführt?




## Wurden Tierseuchenerreger und andere übertragbare Erreger abgeklärt (z.B. Salmonellen, BTV, Schmallenberg-Virus)?



## Persönliche Einschätzung des Betriebes bzgl. Hitzestress




## Welche Hitzestresssymptome wurden beobachtet?






# Welche Massnahmen zur Verminderung von Hitzestress wurden getroffen?




## Verteilung der betroffenen Betriebe (gemäß den ausgefüllten Formularen)




Stand 29.06.26




Stand 06.07.26




Stand 13.07.26



Stand 20.07.26



Stand 27.07.26



Stand 06.08.26

