


Marche à suivre pour la prévention des inhibiteurs dans le lait

- Veillez à ce que les vaches traitées aux antibiotiques soient **clairement** identifiées. Il est préférable de d'abord marquer l'animal et de le traiter ensuite.



- Notez tous les traitements et le délai d'attente correspondant dans votre journal de traitement.
- Éliminez le lait des 4 quartiers et pas seulement celui du quartier traité.
- Trayez les animaux en traitement à la fin, et mieux encore avec un autre faisceau trayeur. Assurez-vous ensuite que le système est correctement nettoyé.
- Discutez des vaches traitées et de leur délai d'attente avec votre personnel de traite.
- Manipulez toujours les médicaments vétérinaires avec précaution, car ils peuvent se propager sur les matériaux de travail et sur les mains. Pensez aussi à vous protéger, car les médicaments peuvent aussi être absorbés par la peau, etc.
- N'oubliez pas que les vieux tuyaux à lait et les gobelets trayeurs deviennent poreux avec le temps : ils peuvent contenir des dépôts de désinfectants et de produits de nettoyage.
- **Attention** : Portez des gants lors de la traite si vous êtes sous traitement médical à cause de vos mains.
- Toutes les installations et équipements de traite qui sont entrés en contact avec du lait contenant des inhibiteurs doivent être rincés avec de l'eau chaude à 50 °C au moins et avec des produits de nettoyage.
- N'utilisez pas le même gobelet de trempage pour les animaux traités et non traités, car cela peut entraîner le transfert d'inhibiteurs.
- En cas de doute, faites analyser le lait. Il existe maintenant de nombreux tests rapides que vous pouvez utiliser simplement à la maison. Les laiteries et les conseillers de traite effectuent également des tests.
- Ne donnez jamais d'aliments moisissus aux vaches laitières. Une moisissure peut naturellement produire l'antibiotique pénicilline. L'alimentation avec des aliments moisissus peut donc conduire à un lait contenant des substances inhibitrices.
- **Attention** : le traitement des vaches avec des produits végétaux tels que l'huile de millepertuis peut également conduire à un résultat positif aux inhibiteurs.

À observer lors de la traite avec un robot de traite

- Vérifiez que le délai d'attente correct soit enregistré dans le système de traite robotisée.
- Vérifiez que le robot de traite sépare correctement le lait.
- Les vaches traitées doivent être traitées au moins 2 fois par jour pour assurer la métabolisation et l'excrétion du médicament.
- Veillez à ce que le robot de traite soit nettoyé avec de l'eau chaude à plus de 50 °C degrés et avec des produits de nettoyage appropriés.