

Percorso d'eradicazione

Start

Test mescolanza/ campioni GTB positivi



**Piano di risanamento in accordo con laboratorio
accreditato**



**I. Campionamento : tutte le bovine
> 14 giorni in lattazione**



**Divisione della mandria in gruppi secondo i
risultati della PCR**



Ordine di mungitura



Ordine di mungitura preliminare:

Gruppo verde: bovine con esito PCR negativo e ≥ 7 sett. dal parto

Gruppo arancione: bovine < 7 sett. dal parto ed esito PCR negativo, bovine che hanno appena partorito, acquistate e/o di rientro dall'alpeggio

Gruppo rosso: bovine con esito PCR positivo e sotto trattamento

1 Mese

II. Campionamento: campionamento singolo di tutte le bovine in lattazione, escluse le bovine nel gruppo rosso*



Ordine di mungitura:

Gruppo verde: SOLO bovine con 2x PCR negativi

Gruppo arancione: bovine con 1. esito PCR negativo, bovine che hanno appena partorito, acquistate e/o di rientro dall'alpeggio

Gruppo rosso: bovine con esito PCR positivo e sotto trattamento

*ev. pooling dei campioni in laboratorio

.....Mensilmente

Prelievi continui di tutte le bovine in lattazione (> 14 dopo il parto), escluse le bovine del gruppo rosso.

1 settimana dopo la fine del tempo di attesa vengono testate le bovine trattate.

Campionamento fino a quando non sono più presenti bovine con esiti PCR positivi

Ordine di mungitura:

Gruppo verde: SOLO bovine con 2x PCR negative

Gruppo arancione: bovine che hanno appena partorito, acquistate e/o di rientro dall'alpeggio



A risanamento completato verranno munte solo bovine esenti da SAGB. Tutte le bovine sono negative a 2x PCR.

Fine del
risanamento